


脂質異常症のスクリーニング



脂質管理目標値 (mg/dl)			
LDL コレステロール	Non-HDL コレステロール	中性脂肪	HDL コレステロール

※1 リスク区分

性別	年齢	危険因子の個数	分類
男性	40～59歳 (40歳未満にも適用)	0個	リスク1
		1個	リスク2
		2個以上	リスク3
	60～74歳	0個	リスク2
		1個	リスク3
		2個以上	リスク3
女性	40～59歳 (40歳未満にも適用)	0個	リスク1
		1個	リスク1
		2個以上	リスク2
	60～74歳	0個	リスク2
		1個	リスク2
		2個以上	リスク3

リスク区分別脂質管理目標値

管理区分	脂質管理目標値 (mg/dl)			
	LDL-C	Non-HDL-C	TG	HDL-C
リスク1	<160	<190	<150	≥40
リスク2	<140	<170		
リスク3	<120	<150		
二次予防 心筋梗塞 狭心症 の既往	<100 (<70)*	<130 (<100)*		

* 家族性高コレステロール血症、急性冠症候群の時に考慮する。糖尿病でも他の高リスク病態（非心原性脳梗塞、末梢動脈疾患（PAD）、慢性腎臓病（CKD）、メタボリックシンドローム、主要危険因子の重複、喫煙）を合併する時はこれに準ずる。